MMPI™-3

Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota™ - 3

Perfil de resultados


Nombre	Andrés
Sexo	Varón
Edad	42
Responsable	
Fecha ev.	
Baremo	

tea hogrefe

Perfil de resultados


Escalas de validez

?	Omisiones	Descripción
	0	Correcto, ausencia de omisiones.



NOTA: PD, Puntuación directa; T, Puntuación típica T (Media=50; Dt = 10)


Dimensiones



NOTA: PD, Puntuación directa; T, Puntuación típica T (Media=50; Dt = 10)

Clínicas reestructuradas


		PD	T
RCd	Desmoralización	-	67
RC1	Quejas somáticas	-	59
RC2	Escasez de emoc. positivas	-	54
RC4	Conducta antisocial	-	53
RC6	Ideas persecutorias	-	83
RC7	Emoc. negativas disfunc.	-	58
RC8	Exp. anormales	-	75
RC9	Activación hipomaníaca	-	48



NOTA: PD, Puntuación directa; T, Puntuación típica T (Media=50; Dt = 10)


Problemas específicos

		PD	T
Somáticas/cognitivas			
MLS	Malestar general	-	59
NUC	Quejas neurológicas	-	66
EAT	Conduc. alim. problem.	-	44
COG	Quejas cognitivas	-	55
Internalizantes			
SUI	Ideación suicida	-	44
HLP	Desesperanza/indefensión	-	58
SFD	Dudas sobre sí misma	-	72
NFC	Ineficacia/indecisión	-	55
STR	Estrés	-	68
WRY	Preocupación	-	72
CMP	Compulsividad	-	52
ARX	Exp. rel. con ansiedad	-	66
ANP	Propensión a la ira	-	51
BRF	Miedos restrictivos de conducta	-	63



NOTA: PD, Puntuación directa; T, Puntuación típica T (Media=50; Dt = 10)


		PD	T
Externalizantes			
FML	Problemas familiares	-	48
JCP	Problemas de conduc. juveniles	-	56
SUB	Abuso de sustancias	-	48
IMP	Impulsividad	-	49
ACT	Activación	-	53
AGG	Agresión	-	62
CYN	Desconfianza	-	45
Interpersonales			
SFI	Autoimportancia	-	42
DOM	Dominancia	-	58
DSF	Aversión social	-	40
SAV	Evitación social	-	44
SHY	Timidez	-	38



NOTA: PD, Puntuación directa; T, Puntuación típica T (Media=50; Dt = 10)

5 Personalidad patológica

		PD	T
AGGR	Agresividad	-	57
PSYC	Psicoticismo	-	87
DISC	Falta de control	-	51
NEGE	Emoc. negativa/neuroticismo	-	60
INTR	Introversión/escasa emoc. positiva	-	47



NOTA: PD, Puntuación directa; T, Puntuación típica T (Media=50; Dt = 10)

Puntuaciones T del MMPI-3 por área

Validez de protocolo

Ausencia de respuesta al contenido	0	57	64	54		
	Omisiones	CRIN	VRIN	TRIN		
Exageración de síntomas	75	67		64	62	69
	F	Fp		Fs	FBS	RBS
Minimización de síntomas	48	41				
	L	K				

Escalas sustantivas

Alteraciones somáticas/cognitivas		59	59	66	44	55		
		RC1	MLS	NUC	EAT	COG		
Alteraciones emocionales	65	67	44	58	72	55		
	EID	RCd	SUI	HLP	SFD	NFC		
		54	47					
		RC2	INTR					
		58	68	72	52	66	51	63	60
		RC7	STR	WRY	CMP	ARX	ANP	BRF	NEGE
Alteraciones del pensamiento	82	83						
	THD	RC6						
		75						
		RC8						
		87						
		PSYC						
Alteraciones conductuales	52	53	48	56	48			
	BXD	RC4	FML	JCP	SUB			
		48	49	53	62	45		
		RC9	IMP	ACT	AGG	CYN		
		51						
		DISC						
Alteraciones en las relaciones interpersonales		42	58	57	40	44	38	
		SFI	DOM	AGGR	DSF	SAV	SHY	

Nota: Se proporciona esta información con el objetivo de facilitar la interpretación siguiendo el orden recomendado en el capítulo Normas de interpretación del manual del MMPI-3.

Escalas con contenido crítico

La persona evaluada ha obtenido una puntuación alta en alguna escala con contenido crítico que puede requerir atención inmediata y seguimiento. Por este motivo, a continuación se detallan los ítems respondidos afirmativamente en la dirección de la escala (V = Verdadero; F = Falso) para ayudar al profesional a evaluar su gravedad y su alcance.

Experiencias de ansiedad (ARX, puntuación T=66)

Ítem	Enunciado	Respuesta
X	Ítems no mostrados por protección en material ilustrativo	V

Ideas persecutorias (RC6, puntuación T=83)

Ítem	Enunciado	Respuesta
X	Ítems no mostrados por protección en material ilustrativo	V