MMPI™-3

Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota™ - 3

Perfil de resultados


Nombre	Natalia
Sexo	Mujer
Edad	33
Responsable	
Fecha ev.	
Baremo	

© Hogrefe TEA ediciones S.A.U.

Perfil de resultados


Escalas de validez

?	Omisiones	Descripción
	0	Correcto, ausencia de omisiones.



NOTA: PD, Puntuación directa; T, Puntuación típica T (Media=50; Dt = 10)


Dimensiones



NOTA: PD, Puntuación directa; T, Puntuación típica T (Media=50; Dt = 10)

Clínicas reestructuradas


		PD	T
RCd	Desmoralización	-	80
RC1	Quejas somáticas	-	57
RC2	Escasez de emoc. positivas	-	75
RC4	Conducta antisocial	-	40
RC6	Ideas persecutorias	-	40
RC7	Emoc. negativas disfunc.	-	61
RC8	Exp. anormales	-	37
RC9	Activación hipomaníaca	-	51



NOTA: PD, Puntuación directa; T, Puntuación típica T (Media=50; Dt = 10)


Problemas específicos

		PD	T
Somáticas/cognitivas			
MLS	Malestar general	-	77
NUC	Quejas neurológicas	-	56
EAT	Conduc. alim. problem.	-	44
COG	Quejas cognitivas	-	53
Internalizantes			
SUI	Ideación suicida	-	44
HLP	Desesperanza/indefensión	-	75
SFD	Dudas sobre sí misma	-	81
NFC	Ineficacia/indecisión	-	81
STR	Estrés	-	76
WRY	Preocupación	-	72
CMP	Compulsividad	-	49
ARX	Exp. rel. con ansiedad	-	59
ANP	Propensión a la ira	-	37
BRF	Miedos restrictivos de conducta	-	56



NOTA: PD, Puntuación directa; T, Puntuación típica T (Media=50; Dt = 10)


		PD	T
Externalizantes			
FML	Problemas familiares	-	51
JCP	Problemas de conduc. juveniles	-	39
SUB	Abuso de sustancias	-	39
IMP	Impulsividad	-	49
ACT	Activación	-	58
AGG	Agresión	-	39
CYN	Desconfianza	-	51
Interpersonales			
SFI	Autoimportancia	-	37
DOM	Dominancia	-	34
DSF	Aversión social	-	52
SAV	Evitación social	-	71
SHY	Timidez	-	77



NOTA: PD, Puntuación directa; T, Puntuación típica T (Media=50; Dt = 10)

5 Personalidad patológica

		PD	T
AGGR	Agresividad	-	31
PSYC	Psicoticismo	-	47
DISC	Falta de control	-	43
NEGE	Emoc. negativa/neuroticismo	-	72
INTR	Introversión/escasa emoc. positiva	-	81



NOTA: PD, Puntuación directa; T, Puntuación típica T (Media=50; Dt = 10)

Puntuaciones T del MMPI-3 por área

Validez de protocolo

Ausencia de respuesta al contenido	0	48	51	54		
	Omisiones	CRIN	VRIN	TRIN		
Exageración de síntomas	72	58		58	59	50
	F	Fp		Fs	FBS	RBS
Minimización de síntomas	52	35				
	L	K				

Escalas sustantivas

Alteraciones somáticas/cognitivas		57	77	56	44	53		
		RC1	MLS	NUC	EAT	COG		
Alteraciones emocionales	83	80	44	75	81	81		
	EID	RCd	SUI	HLP	SFD	NFC		
		75	81					
		RC2	INTR					
		61	76	72	49	59	37	56	72
		RC7	STR	WRY	CMP	ARX	ANP	BRF	NEGE
Alteraciones del pensamiento	44	40						
	THD	RC6						
		37						
		RC8						
		47						
		PSYC						
Alteraciones conductuales	42	40	51	39	39			
	BXD	RC4	FML	JCP	SUB			
		51	49	58	39	51		
		RC9	IMP	ACT	AGG	CYN		
		43						
		DISC						
Alteraciones en las relaciones interpersonales		37	34	31	52	71	77	
		SFI	DOM	AGGR	DSF	SAV	SHY	

Nota: Se proporciona esta información con el objetivo de facilitar la interpretación siguiendo el orden recomendado en el capítulo Normas de interpretación del manual del MMPI-3.

Escalas con contenido crítico

La persona evaluada ha obtenido una puntuación alta en alguna escala con contenido crítico que puede requerir atención inmediata y seguimiento. Por este motivo, a continuación se detallan los ítems respondidos afirmativamente en la dirección de la escala (V = Verdadero; F = Falso) para ayudar al profesional a evaluar su gravedad y su alcance.

Desesperanza/indefensión (HLP, puntuación T=75)

Ítem	Enunciado	Respuesta
X	Ítems no mostrados por protección en material ilustrativo	V